




TÅREVEJSSTENOSE - AFLØBSHINDRING I TÅREVEJENE HOS BØRN

Det er normal anatomi - giv det gerne lidt tid

Tåreveje udvikles sent i fostertilværelsen, og hos mange børn sker det først efter fødslen. Det betyder også, at symptomerne forsvinder af sig selv hos langt de fleste i løbet af 1-1½ år. Det er ca. på dette tidspunkt, at dimensionerne i næsen normaliseres, hvor afløbet (tårevejen) tømmer dig.

Hvis problemerne ikke løser sig, er der behov for yderligere behandling i form af et mindre kirurgisk indgreb.



Hvilke symptomer kan vores barn have?

Fra 2-6 ugers alderen en- eller dobbeltsidig (33 %) symptomer i form af tåreflod og/eller tilbagevendende øjenbetændelse. Klatter og tilklistring i et ofte blegt øje. Kortvarig effekt af lokal antibiotika. Tåreflod forværres i kulde og blæst. Vi anbefaler alene antibiotika hvis slimhinden er rød og der findes med relevant fund.

Hvad undersøger lægen?

Først foretaget vi en generel børne-øjens undersøgelse - også med henblik på differentialdiagnostik (er der andre årsager?). Herefter vurderer øjenlægen størrelse af tåremenis, betændelse, hævelse over tåresækken, mulighed for at eksprimere pus ved massage af tåresækken, synlige misdannelser i øjenlåg eller tårepunkt.

Behandlingsmuligheder

I anbefales tåresæksmassage 10-15 sekunder 2-3 gange pr dag, hvor der ”malkes” ned mod næsen, for at se om det kan skabe passage. Hvis dette hjælper vil der ikke være behov for kirurgi

På sygehuset kan - ved manglende effekt - gøres følgende tre procedure

- 1) Skulle tårevejene
- 2) Sondering
- 3) Silikoneslange anlæggelse